

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Иван

**Возраст:** 31

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.11.2024 20:00:48

**формирования заключения врача:** 24.11.2024 11:36:44

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/317123/answer/317132>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на **потерю чувствительности полового члена** в течение последних двух лет. Уточнения по поводу сохранности других функций полового члена (эрекция, эякуляция и т.д.) отсутствуют.

## Анамнез заболевания

Проблема началась около двух лет назад. Пациент посетил уролога, который рекомендовал сдать анализы крови на общий тестостерон, ГСПГ, пролактин, а также провести бактериальный посев эякулята с определением чувствительности к антибиотикам. Также было назначено УЗИ простаты. Уролог прописал антибиотик **Цефиксим 400 мг** и свечи **Простатекс**.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

## Интерпретация предоставленных данных

Потеря чувствительности полового члена может быть связана с различными факторами, включая гормональные изменения, инфекционные процессы, неврологические нарушения или психологические факторы. Назначенные анализы и УЗИ простаты помогут исключить инфекционные и гормональные причины. Однако, применение Цефиксима и Простатекса маловероятно решит проблему, если причина не связана с инфекцией или воспалением простаты.

## Заключение

На основании предоставленной информации, потеря чувствительности может быть связана с неврологическими или психологическими факторами, а также с гормональными изменениями. Необходимо более детально выяснить, какие именно функции полового члена сохранены, чтобы уточнить диагноз.

## Рекомендации

- 1. Уточнить симптомы:** Опишите более подробно, что вы имеете в виду под "потеря чувствительности". Сохранены ли эрекция, эякуляция и другие функции?
- 2. Провести рекомендованные анализы:** Это поможет уточнить причину потери

чувствительности.

3. **Консультация невролога:** Для исключения неврологических причин потери чувствительности.

4. **Консультация психотерапевта:** Психологические факторы могут играть значительную роль в изменении чувствительности.

5. **Поддержка партнера:** Обсудите проблему с партнером, это может помочь снизить психологическое напряжение.

6. **Здоровый образ жизни:** Избегание стрессов, регулярные физические упражнения и правильное питание могут положительно сказаться на общем состоянии здоровья и сексуальной функции.