Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Роман

Возраст: 48

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.11.2024 12:17:24

формирования заключения врача: 24.11.2024 11:51:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/317126/answer/317135

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **боль в паху**, которая усилилась после лечения. Также отмечает **отсутствие спермы при эякуляции** и **появление пены в моче**. Дополнительно испытывает **сильные боли в висках**.

Анамнез заболевания

Пациенту был поставлен диагноз **простатит**. Назначено лечение антибиотиками: **офлоксацин** и **панцеф**. После 20 дней лечения наблюдалось облегчение симптомов, однако осталась пена в моче. Через две недели после окончания курса боли возобновились. Пациент самостоятельно начал прием **офлоксацина** и **профлосина**. В результате приема этих препаратов исчезла сперма при эякуляции, и усилились боли в паху и висках.

Анамнез жизни

Информация о значимых событиях в жизни пациента, не связанных напрямую с урологической проблемой, отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

Симптомы пациента могут указывать на **хронический простатит** или **синдром хронической тазовой боли**. Отсутствие спермы при эякуляции может быть связано с ретроградной эякуляцией, что может быть побочным эффектом приема альфа-блокаторов, таких как профлосин. Пена в моче может свидетельствовать о присутствии белка, что требует дополнительного исследования. Усиление боли в висках может быть связано с побочными эффектами лекарств или стрессом.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие **хронического простатита** с возможным развитием ретроградной эякуляции как побочного эффекта лечения. Необходима дальнейшая диагностика для исключения других заболеваний, таких как инфекции мочевыводящих путей или системные заболевания.

Рекомендации

1. **Обратиться к лечащему урологу** для корректировки текущего лечения и обсуждения симптомов ретроградной эякуляции.

2. **Провести анализ мочи** для оценки наличия белка и других аномалий.

3. **Консультация с терапевтом или неврологом** для оценки причин болей в висках.

4. **Обсудить с врачом-урологом возможность изменения терапии**, учитывая побочные эффекты.

5. **Избегать самолечения** и строго следовать рекомендациям врача.

6. **Поддерживать здоровый образ жизни**, включая регулярные физические упражнения и сбалансированное питание, что может помочь в улучшении общего состояния здоровья.