Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Михаил

Возраст: 76

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.11.2024 17:01:28

формирования заключения врача: 24.11.2024 12:07:55

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/317129/answer/317140

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на повышенное количество лейкоцитов и эритроцитов в моче после трансуретральной тулевой лазерной энуклеации простаты, проведенной два месяца назад. Жалоб на общее самочувствие и дополнительные симптомы не представлено.

Анамнез заболевания

Пациент перенес трансуретральную тулевую лазерную энуклеацию простаты два месяца назад. После операции отмечается увеличение количества лейкоцитов и эритроцитов в моче по анализу Нечипоренко: 55000 лейкоцитов и 27500 эритроцитов. Цилиндры отсутствуют. Общий анализ крови без отклонений.

Анамнез жизни

Значимые события в жизни пациента, не связанные напрямую с урологической проблемой, не указаны.

Интерпретация предоставленных данных

Повышенное количество лейкоцитов и эритроцитов в моче может свидетельствовать о продолжающемся процессе заживления после операции. Отсутствие цилиндров и нормальный общий анализ крови могут указывать на отсутствие системного воспалительного процесса. Такие изменения могут быть нормальными в процессе заживления, особенно до полной эпителизации внутренней раневой поверхности, что может занять до шести месяцев в зависимости от объема удаленной ткани.

Заключение

На основании представленных данных можно предположить, что изменения в анализах мочи связаны с процессом заживления после операции. Однако необходимо учитывать возможные осложнения, такие как инфекция мочевыводящих путей или воспаление, особенно при наличии дополнительных жалоб.

Рекомендации

1. **Мониторинг состояния**: Регулярно сдавать анализы мочи для контроля динамики изменений.

2. **Консультация уролога**: При наличии жалоб или ухудшении состояния рекомендуется

очная консультация с урологом для более детального обследования.

3. **Обсуждение с лечащим врачом**: Обсудить с урологом возможность проведения дополнительных исследований, таких как УЗИ почек и мочевого пузыря с остаточной мочой, урофлоуметрия.

4. **Общий уход за здоровьем**: Поддерживать здоровый образ жизни, включая адекватное потребление жидкости и соблюдение рекомендаций по питанию.