Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Лена

Возраст: 48

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 25.11.2024 15:20:50

формирования заключения врача: 25.11.2024 20:54:52

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/317153/answer/317158

Заключение врача

Жалобы

Пациентка сообщает, что у её мужа появился синяк на стволе полового члена. Боль отсутствует. Половой акт был 3 дня назад, и он был не травматичным. Мужчина отрицает измену и мастурбацию. Также упоминается, что он переносил ящик, но не испытывал боли.

Анамнез заболевания

Синяк был обнаружен сегодня, спустя три дня после последнего полового акта. Мужчина не замечал никаких других симптомов или изменений в состоянии здоровья.

Анамнез жизни

Никаких значительных событий, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не сообщается.

Интерпретация предоставленных данных

Синяк на половом члене может возникнуть по ряду причин, включая механическую травму, даже если она не была замечена в момент её получения. Переноска тяжёлых предметов, таких как ящик, может вызвать давление на область паха, что в редких случаях может привести к образованию гематомы. Также возможно, что синяк мог появиться из-за незначительных травм во время полового акта, даже если он был нежным.

Заключение

На основании предоставленных данных, вероятной причиной синяка является механическая травма, возможно, связанная с физической нагрузкой или незначительным повреждением во время полового акта. Отсутствие боли и других симптомов указывает на то, что ситуация не является срочной.

Рекомендации

1. **Наблюдение:** Следите за состоянием гематомы. Если он не исчезнет в течение 1-2 недель или начнёт увеличиваться, появится боль или другие симптомы, рекомендуется обратиться к врачу для более детального обследования.

2. **Избегание травм:** Постарайтесь избегать физической активности, которая может вызвать дополнительное давление на область паха.

3. **Общение с партнёром:** Обсудите с мужем возможные причины и убедитесь, что он чувствует себя комфортно и не испытывает стресса по этому поводу.

4. **Консультация:** Если ситуация вызывает беспокойство или появляются новые симптомы, рассмотрите возможность консультации с урологом для исключения других причин, таких как заболевания сосудов или кожные проблемы.