Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Максим

Возраст: 24

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 30.11.2024 20:06:19

формирования заключения врача: 30.11.2024 21:02:50

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/317190/answer/317194

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на хронический баланопостит, "холодный половой член", боль в яичках, преимущественно справа, и боль в пояснице. Отмечает, что симптомы появились после начала приема антибиотиков (доксициклин, метронидазол, флюконазол). Также замечает связь между холодными ногами и ощущением холода в половом члене.

Анамнез заболевания

Пациенту поставлен диагноз хронического баланопостита и варикоцеле с левой стороны. Антибиотики были назначены, несмотря на отсутствие симптомов на момент постановки диагноза. После начала лечения появились новые симптомы, такие как "холодный половой член" и боль в пояснице.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Хронический баланопостит может вызывать различные симптомы, включая дискомфорт и изменения в ощущениях. Варикоцеле может вызывать боль в яичках, хотя боль обычно локализуется на стороне поражения. Ощущение холода в половом члене может быть связано с сосудистыми изменениями или нервной регуляцией, а также с общим состоянием организма, например, с температурой ног. Боль в пояснице может быть связана с почками, но также может быть результатом мышечного напряжения или других факторов.

Заключение

Симптомы пациента могут быть связаны с побочными эффектами от приема антибиотиков, сосудистыми или нервными изменениями, а также с варикоцеле.

Рекомендации

1. Рассмотрите возможность временной отмены антибиотиков и наблюдения за изменением симптомов. Это может помочь определить, связаны ли симптомы с приемом лекарств.
2. Обратитесь к лечащему врачу для оценки необходимости продолжения антибиотикотерапии и возможной коррекции лечения.
3. Рассмотрите возможность консультации с сосудистым хирургом или неврологом для оценки состояния сосудов и нервной системы.

4. Для облегчения боли в пояснице рекомендуется легкая физическая активность, растяжка и, при необходимости, прием обезболивающих препаратов по согласованию с врачом.
5. Обсудите с врачом возможность проведения дополнительных исследований, таких как УЗИ почек и органов мошонки, для исключения других патологий.
6. Обратите внимание на психологический аспект проблемы. Обсудите с партнером возникшие трудности и постарайтесь совместно найти пути их решения.