



Информационно-консультативный портал
для урологических пациентов

18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 55

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 03.12.2024 21:22:04

формирования заключения врача: 04.12.2024 08:44:49

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317223/answer/317226>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **ретроградную эякуляцию**, возникшую после операции по аблацииadenомы предстательной железы. Отмечает, что ранее принимал Омник, что также вызывало ретроградную эякуляцию, но этот симптом исчезал.

Анамнез заболевания

В конце октября была проведена операция по аблации adenомы предстательной железы. До операции пациент длительное время принимал Омник, который вызывал ретроградную эякуляцию в начале приема, но позже этот симптом исчез. После операции ретроградная эякуляция возобновилась, и пациент продолжает прием Омника, как рекомендовано врачами.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Ретроградная эякуляция после операций на предстательной железе, таких как аблация, является известным побочным эффектом. Это связано с тем, что операция может повлиять на функцию сфинктера мочевого пузыря, что приводит к попаданию спермы в мочевой пузырь вместо выхода через уретру. Омник (тамсулозин) также может способствовать этому процессу, расслабляя мышцы шейки мочевого пузыря.

Заключение

С большой долей вероятности, ретроградная эякуляция не исчезнет даже на фоне терапии. Редко бывают случаи самостоятельного восстановления нормального направления эякуляции в результате reparативных процессов в простате и шейке мочевого пузыря. Медикаментозная терапия в таких случаях малоэффективна, и это состояние обычно является постоянным последствием хирургического вмешательства.

Рекомендации

- 1. Консультация с урологом на очном приеме:** Обсудите возможность изменения терапии или дополнительных методов лечения, которые могут помочь в управлении симптомами, хотя медикаментозная терапия часто малоэффективна.
- 2. Психологическая поддержка:** Поскольку ретроградная эякуляция может влиять на

качество жизни и психологическое состояние, рекомендуется обсудить это с партнером и, при необходимости, обратиться за консультацией к психологу.

3. Образ жизни и здоровье: Поддержка общего здоровья, включая физическую активность и здоровое питание, может способствовать улучшению общего самочувствия.

Важно помнить, что ретроградная эякуляция не влияет на способность к оргазму и не является опасной для здоровья, но может требовать адаптации и понимания со стороны пациента и его партнера.