

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Никита

**Возраст:** 19

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.12.2024 14:56:45

**формирования заключения врача:** 04.12.2024 21:29:48

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/317227/answer/317230>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на боль в яичке, которая ранее была в левом яичке, а затем появилась в правом. В настоящее время боль отсутствует после начала лечения.

## Анамнез заболевания

5 ноября пациент обратился в хирургическое отделение с болью в левом яичке, где был диагностирован перекрут яичка. Была проведена операция, в ходе которой яичко было спасено, и удалены гидатиды. Швы сняты 26 ноября. 29 ноября пациент снова обратился с болью, но уже в правом яичке, где был диагностирован орхит. Назначено медикаментозное лечение, которое пациент принимает в течение 5 дней, после чего боль исчезла.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим заболеванием, не указано.

## Интерпретация представленных данных

Пациент перенес операцию по поводу перекрута яичка и последующее лечение орхита. Орхит — это воспалительное заболевание яичка, которое может быть вызвано инфекцией или травмой. Лечение включает прием противовоспалительных и антибактериальных препаратов, что, судя по всему, дало положительный эффект, так как боль исчезла.

## Заключение

На основании предоставленной информации можно предположить, что пациент успешно восстанавливается после операции и лечения орхита. Однако важно следить за состоянием и избегать факторов, которые могут спровоцировать рецидив.

## Рекомендации

- 1. Воздержание от мастурбации и половой активности:** Рекомендуется подождать не менее 2-3 недель после исчезновения симптомов орхита, чтобы дать организму время полностью восстановиться. Это поможет избежать возможных осложнений.
- 2. Продолжение медикаментозного лечения:** Завершите курс назначенных препаратов, даже если симптомы исчезли, чтобы предотвратить рецидив.
- 3. Наблюдение за состоянием:** Внимательно следите за любыми изменениями в состоянии

яичек, такими как боль, отек или покраснение. При появлении таких симптомов обратитесь к врачу.