

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 27

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 06.12.2024 12:06:01

формирования заключения врача: 06.12.2024 17:45:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317235/answer/317236>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **жжение** в области уретры после извлечения катетера Фолея, баллон которого ранее лопнул.

Анамнез заболевания

Пациенту был установлен катетер Фолея по медицинским показаниям. В процессе использования катетера произошел разрыв баллона, после чего катетер был извлечен. После извлечения катетера пациент начал испытывать жжение в уретре.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основным урологическим вопросом, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

Жжение в уретре после извлечения катетера может быть связано с несколькими факторами: механическое раздражение слизистой оболочки уретры, возможное воспаление или инфекция, вызванные повреждением уретры при разрыве баллона. Важно учитывать, что подобные симптомы могут быть временными, но требуют наблюдения.

Заключение

Симптомы жжения после извлечения катетера Фолея могут свидетельствовать о **раздражении или воспалении уретры**. Необходимо исключить инфекционные осложнения и оценить состояние слизистой оболочки уретры.

Рекомендации

- Обратиться к урологу** для проведения осмотра и, при необходимости, дополнительных исследований (например, анализ мочи, уретроскопия).
- Поддерживать гигиену** области уретры, избегая использования агрессивных моющих средств.
- Пить достаточное количество воды** для поддержания нормального диуреза и снижения риска инфекций.
- При сохранении или усилении симптомов, а также при появлении других симптомов (например, лихорадка, выделения из уретры), **немедленно обратиться за медицинской**

помощью.

5. Избегать половых контактов до разрешения симптомов, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции или раздражение уретры.