

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 35

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 06.12.2024 21:16:01

формирования заключения врача: 07.12.2024 13:37:54

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317237/answer/317239>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **изменение консистенции спермы**, которая стала жидкой, как вода, после установки стента в почку.

Анамнез заболевания

Пациент перенес **удаление камня в почке** и последующую установку стента. После выписки начались изменения в консистенции спермы. В настоящее время принимает следующие препараты: Омник (тамсулозин), Ломфлокс (ломефлоксацин), Онпельвицит, Нерей.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных напрямую с основным урологическим заболеванием, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Изменение консистенции спермы может быть связано с несколькими факторами: 1. **Медикаментозная терапия:** Омник (тамсулозин) может влиять на эякуляцию, вызывая ретроградную эякуляцию или уменьшение объема спермы. Антибиотики, такие как Ломфлокс, могут временно изменять состав спермы. 2. **Стресс и хирургическое вмешательство:** Недавняя операция и установка стента могут повлиять на общее состояние организма, включая репродуктивную систему. 3. **Инфекции или воспаления:** Возможные инфекции мочеполовой системы могут также влиять на качество спермы.

Заключение

Изменение консистенции спермы, вероятно, связано с комбинацией медикаментозной терапии и недавнего хирургического вмешательства. Важно учитывать возможные побочные эффекты принимаемых препаратов.

Рекомендации

- Продолжить наблюдение:** Следить за изменениями в состоянии и при необходимости обратиться за повторной консультацией.
- Обсудить с лечащим урологом:** Рассмотреть возможность коррекции медикаментозной терапии, если изменения в сперме вызывают беспокойство.

3. Психологическая поддержка: Обсудить изменения с партнером, чтобы снизить возможное психологическое напряжение.

4. Дополнительные обследования: При сохранении симптомов рекомендуется провести анализ спермы (спермограмма) и консультацию с урологом для более детальной оценки состояния.

5. Образ жизни: Поддерживать здоровый образ жизни, включая правильное питание и физическую активность, что может способствовать улучшению общего состояния здоровья.