Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Антон

Возраст: 18

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.12.2024 01:21:27

формирования заключения врача: 07.12.2024 13:40:07

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/317238/answer/317240

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **снижение эрекции** во время острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ), сопровождающегося высокой температурой (38-39°C). Отмечает отсутствие утренней эрекции и трудности с поддержанием эрекции после значительных усилий.

Анамнез заболевания

Пациент болеет ОРВИ в течение 2 дней. Симптомы включают высокую температуру и, возможно, общую слабость и недомогание, характерные для вирусных инфекций.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных напрямую с текущей проблемой, не указано. Пациент молод, что может указывать на отсутствие хронических заболеваний.

Интерпретация предоставленных данных

Уменьшение эрекции во время болезни может быть связано с несколькими факторами. **ОРВИ** и высокая температура могут вызывать общую слабость, усталость и снижение уровня энергии, что может временно повлиять на эрекцию. Организм сосредоточен на борьбе с инфекцией, что может временно снизить сексуальную функцию. Это состояние обычно временное и должно улучшиться после выздоровления.

Заключение

Снижение эрекции, вероятно, связано с текущим состоянием здоровья и высокой температурой, вызванной ОРВИ. Это временное явление, и после выздоровления сексуальная функция должна восстановиться.

Рекомендации

1. **Продолжайте лечение ОРВИ**: Следуйте рекомендациям по лечению вирусной инфекции, включая отдых, обильное питье и, при необходимости, прием жаропонижающих средств.

2. **Избегайте стресса**: Не беспокойтесь о временном снижении эрекции. Это нормальная реакция организма на болезнь.

3. **Обратитесь к урологу**, если симптомы сохранятся после выздоровления: Если после

полного выздоровления эрекция не восстановится, рекомендуется обратиться к специалисту для дальнейшего обследования.

4. **Поддерживайте открытое общение с партнером**, если это актуально: Обсуждение временных трудностей может помочь снизить стресс и улучшить взаимопонимание в отношениях.