Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Антон

Возраст: 38

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.12.2024 06:24:25

формирования заключения врача: 11.12.2024 09:33:50

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/317259/answer/317262

Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на появление набухшей вены на головке полового члена в области уздечки после полового акта.

Анамнез заболевания

Сообщается о внезапном появлении набухшей вены после полового акта. Ранее подобных симптомов не наблюдалось. Информация о проведенных ранее обследованиях или лечении отсутствует.

Анамнез жизни

Значимых событий в анамнезе жизни, которые могли бы быть связаны с текущей проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

Набухшая вена на головке полового члена может быть связана с несколькими факторами, включая механическое воздействие или повышенное давление в венах во время полового акта. Это состояние часто является временным и может исчезнуть самостоятельно. Однако, если симптомы сохраняются или сопровождаются болью, изменением цвета кожи или другими необычными признаками, это может требовать более детального обследования.

Заключение

На основании предоставленной информации, вероятной причиной появления набухшей вены является временное расширение венозных сосудов вследствие механического воздействия во время полового акта.

Рекомендации

1. **Наблюдение**: В течение нескольких дней наблюдайте за состоянием вены. Если она не уменьшится в размерах или появятся другие симптомы (боль, изменение цвета), рекомендуется обратиться к урологу.

2. **Избегание травм**: Постарайтесь избегать механического воздействия на эту область в ближайшее время.

3. **Обследование**: Если симптомы сохраняются, рекомендуется провести ультразвуковое

исследование сосудов полового члена для исключения тромбоза или других сосудистых патологий.

4. **Психологический аспект**: Обсудите с партнером возникшую проблему, чтобы избежать возможных психологических барьеров в будущем.

5. **Консультация специалиста**: При необходимости, обратитесь к урологу для более детального обследования и получения рекомендаций по лечению.