

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Артем

Возраст: 19

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.12.2024 00:10:38

формирования заключения врача: 15.12.2024 10:24:02

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/317422/answer/317423>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на вращение левого яичка вокруг своей оси, что сопровождается изменением положения придатка яичка. Отмечает, что придаток может быть повернут на 150-160 градусов вперед относительно тела, а яичко находится сзади. Также наблюдается красноватый цвет мошонки.

Анамнез заболевания

Пациент заметил проблему при переодевании. Вращение яичка происходит почти на 180 градусов, и пациент самостоятельно исправляет это положение пальцами. Симптомы проявляются, когда мошонка расслаблена.

Анамнез жизни

Значительных событий, не связанных с основной урологической проблемой, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

Вращение яичка вокруг своей оси может указывать на повышенную подвижность яичка, что может быть связано с анатомическими особенностями, такими как длинная семенная канатика или слабая фиксация яичка. Красноватый цвет мошонки может свидетельствовать о локальном воспалении или раздражении кожи.

Заключение

Симптомы могут указывать на повышенную подвижность яичка, что в редких случаях может привести к перекруту яичка, состоянию, требующему неотложной медицинской помощи. Однако, учитывая, что пациент самостоятельно исправляет положение яичка, это может быть вариантом нормы, но требует наблюдения.

Рекомендации

- Консультация уролога:** Рекомендуется обратиться к урологу для проведения физического осмотра и, возможно, ультразвукового исследования мошонки, чтобы исключить риск перекрута яичка.
- Наблюдение за симптомами:** Следите за появлением боли, отека или изменением цвета мошонки, что может указывать на необходимость срочного медицинского вмешательства.

3. Общая гигиена: Поддерживайте хорошую гигиену, чтобы избежать раздражения кожи мошонки.

4. Избегание тесной одежды: Носите свободное белье, чтобы уменьшить давление на мошонку и предотвратить дальнейшее раздражение.

Будьте внимательны к своему состоянию и, при необходимости, обратитесь за медицинской помощью.