Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Кирилл

**Возраст:** 19

**Пол:** Мужской

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 02.01.2025 17:37:33

**формирования заключения врача:** 02.01.2025 18:19:19

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://03uro.ru/consultations/question/318131/answer/318133

# Заключение врача

## Жалобы

Пациент обращается с вопросом о правильности заживления после обрезания, проведенного 17 дней назад. Отмечает наличие припухлости вокруг головки полового члена.

## Анамнез заболевания

17 дней назад пациенрту было проведено обрезание. Послеоперационный уход включает обработку хлоргексидином и нанесение мази Левомеколь.

## Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

## Интерпретация предоставленных данных

На 17-й день после обрезания заживление обычно продолжается, и наличие некоторой припухлости может быть нормальным явлением. Хлоргексидин и Левомеколь помогают предотвратить инфекцию и способствуют заживлению. Однако, для более точной оценки состояния раны и исключения осложнений, таких как инфекция или чрезмерное воспаление, требуется визуальный осмотр.

## Заключение

На данном этапе заживление может считаться нормальным, однако для окончательной оценки необходим визуальный осмотр. Припухлость может сохраняться в течение нескольких недель, но должна постепенно уменьшаться.

## Рекомендации

1. **Продолжайте уход**: Продолжайте обработку хлоргексидином и нанесение мази Левомеколь, как рекомендовано.

2. **Наблюдайте за симптомами**: Обратите внимание на признаки инфекции, такие как усиление боли, покраснение, выделения или повышение температуры.

3. **Фотографии для оценки**: Для дистанционной оценки качества заживления можно сделать фотографии. Убедитесь, что фотографии четкие, сделаны при хорошем освещении и показывают область заживления со всех сторон.

4. **Очный осмотр**: Если припухлость не уменьшается или появляются другие тревожные

симптомы, рекомендуется очный визит к урологу для более детальной оценки.