Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Катя

Возраст: 55

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.01.2025 09:46:26

формирования заключения врача: 04.01.2025 12:18:25

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/318152/answer/318157

Заключение врача

Жалобы

Пациентка жалуется на **сильные боли** в области мочеточника, **уменьшение частоты мочеиспускания**, **приливы жара**, а также **вздутие и повышение температуры** в области почки при прикосновении. Отмечается **аллергическая реакция** на препарат Цистон.

Анамнез заболевания

Пациентка ранее перенесла **две операции по удалению камней** в мочевыводящих путях. На данный момент у нее диагностирован камень размером 1 см 2 мм в нижней трети мочеточника. Препарат Цистон был назначен, но вызвал аллергическую реакцию.

Анамнез жизни

Данные о других значимых событиях в жизни пациентки, которые могут повлиять на текущее состояние, не предоставлены.

Интерпретация предоставленных данных

Симптомы, такие как **сильные боли**, **уменьшение мочеиспускания**, и ощущение "**вздутия почки"**, могут указывать на **обструкцию мочеточника** камнем, что может привести к **гидронефрозу** и потенциальной инфекции мочевых путей. **Приливы жара** могут быть связаны с реакцией организма на боль или стресс или повышение температуры тела за счет рефлюкса мочи. Аллергическая реакция на Цистон требует отмены препарата и поиска альтернативных методов лечения.

Заключение

Состояние пациентки требует **немедленного медицинского вмешательства** из-за риска осложнений, таких как инфекция и развития пиелонефрита. Наличие камня в мочеточнике и сопутствующие симптомы указывают на необходимость срочной оценки и восстановление оттока мочи из почки

Рекомендации

1. **Немедленно обратиться за медицинской помощью**: Если больница не принимает, следует рассмотреть возможность обращения в другое медицинское учреждение или вызова скорой помощи.

2. **Обезболивающие препараты**: Продолжать прием обезболивающих, но под контролем

врача, чтобы избежать передозировки и побочных эффектов.

3. **Гидратация**: Увеличить потребление жидкости, если это не противопоказано, для поддержания функции почек.

4. **Альтернативные препараты**: Обсудить с врачом возможность назначения других препаратов для облегчения состояния, учитывая аллергическую реакцию на Цистон.

5. **Мониторинг состояния**: Внимательно следить за изменениями в состоянии, особенно за появлением температуры, что может указывать на инфекцию.

6. **Психологическая поддержка**: Обеспечить эмоциональную поддержку пациентке, так как стресс и боль могут ухудшать общее состояние.

Пациентке и её семье рекомендуется активно искать медицинскую помощь и не откладывать обращение за ней, учитывая потенциальные риски.