

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Влад

**Возраст:** 23

**Пол:** Мужской

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 04.01.2025 21:16:15

**формирования заключения врача:** 06.01.2025 08:31:07

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/318159/answer/318166>



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на увеличение и отек полового члена после мастурбации.

## Анамнез заболевания

Пациент сообщает, что отек полового члена возник после мастурбации в ванной. Дополнительная информация о времени появления симптомов, их продолжительности и наличии других симптомов отсутствует.

## Анамнез жизни

Значимые события в жизни пациента, которые могут повлиять на текущее состояние, не указаны. Важно уточнить наличие хронических заболеваний, аллергий, перенесенных операций и травм.

## Интерпретация предоставленных данных

Отек полового члена после мастурбации может быть связан с механическим раздражением тканей, что может вызвать временный отек. Это состояние обычно не требует серьезного вмешательства и проходит самостоятельно. Однако, если отек сопровождается болью, изменением цвета кожи, выделениями или другими тревожными симптомами, это может указывать на более серьезные проблемы, такие как инфекция или травма, и требует медицинского осмотра.

## Заключение

На основании предоставленной информации, вероятной причиной отека является механическое раздражение тканей полового члена. Однако, без дополнительной информации и осмотра, невозможно исключить другие причины.

## Рекомендации

1. Наблюдайте за состоянием в течение 24-48 часов. Если отек не уменьшится или появятся другие симптомы, обратитесь к врачу для очного осмотра.
2. Избегайте дальнейшего механического раздражения пораженной области до полного исчезновения симптомов.
3. При необходимости используйте холодный компресс для уменьшения отека, но не более чем на 15-20 минут за раз.
4. Обсудите с партнером любые возникающие проблемы, чтобы избежать недопонимания и

стресса.

5. Если вы испытываете беспокойство по поводу своего состояния, не стесняйтесь обратиться за консультацией к специалисту.