

# Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

Имя: Иван

Возраст: 31

Пол: Мужской

## Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

## Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.01.2025 12:27:44

формирования заключения врача: 13.01.2025 10:32:57

# Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/318262/answer/318275



# Заключение врача

## Жалобы

Пациент жалуется на **боязнь приема тадалафила** из-за возможных побочных эффектов, таких как **жжение** лица и легкое головокружение. Также интересуется безопасностью использования мази Акриол ПРО для решения проблемы преждевременной эякуляции (ПЭ).

### Анамнез заболевания

Пациенту был назначен тадалафил в дозировке 5 мг для приема накануне и в день встречи с новой девушкой для борьбы с синдромом тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН). Вчера после приема препарата пациент отметил жжение лица и легкое головокружение.

# Анамнез жизни

Значимых событий в жизни пациента, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не указано.

# Интерпретация предоставленных данных

Тадалафил является ингибитором фосфодиэстеразы типа 5 и используется для лечения эректильной дисфункции. **Жжение лица и головокружение** могут быть побочными эффектами препарата, но обычно они не представляют серьезной опасности. Однако, если симптомы усиливаются или вызывают значительный дискомфорт, следует обсудить это с врачом. Акриол ПРО, как аналог Элмы, используется для местного обезболивания и может помочь в снижении чувствительности головки полового члена, что может быть полезно при ПЭ. Однако, важно следовать инструкциям по применению и убедиться, что мазь полностью смыта перед половым актом.

#### Заключение

Тадалафил в дозировке 5 мг обычно безопасен, но может вызывать легкие побочные эффекты, такие как жжение лица и головокружение. Акриол ПРО может быть эффективным средством для временного снижения чувствительности, но его использование должно быть осторожным.

#### Рекомендации

- 1. **Продолжайте прием тадалафила** в назначенной дозировке, если побочные эффекты остаются легкими. Если они усиливаются, **обратитесь к лечащему урологу**.
- 2. Используйте Акриол ПРО согласно инструкции, нанося на головку полового члена и

смывая через 15 минут. Убедитесь, что мазь полностью удалена перед половым актом.

- 3. Обсудите свои опасения с партнером, чтобы снизить уровень тревожности и улучшить качество интимной жизни.
- 4. Следите за своим состоянием и при необходимости обратитесь за дополнительной консультацией к урологу.
- 5. **Избегайте самолечения** и не превышайте рекомендованные дозировки препаратов без консультации врача.