

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анастасия

Возраст: 41

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 12.01.2025 17:24:42

формирования заключения врача: 13.01.2025 10:37:03

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318263/answer/318276>



Заключение врача

Жалобы

Пациентка жалуется на **высокую температуру** после процедуры стентирования почки.

Анамнез заболевания

Пациентке было проведено **стентирование почки**. Процедура обычно назначается для восстановления оттока мочи из почки, например, при наличии камней, стриктур или опухолей. После процедуры пациентка начала испытывать повышение температуры тела.

Анамнез жизни

Значимых событий в анамнезе жизни, которые могли бы повлиять на текущее состояние, не указано. Важно учитывать наличие хронических заболеваний, аллергий и предыдущих операций.

Интерпретация представленных данных

Высокая температура после стентирования может указывать на **инфекционное осложнение**. Возможные причины включают инфекцию мочевыводящих путей, пиелонефрит, отсутствие восстановления оттока мочи из стентированной почки или реакцию на сам стент.

Заключение

На основании представленных данных, высокая температура после стентирования может быть связана с инфекционным процессом. Однако, для точного диагноза требуется дополнительная информация и обследования.

Рекомендации

- Обратитесь за медицинской помощью:** Необходимо срочно обратиться к лечащему урологу для оценки состояния и исключения инфекционных осложнений.
- Лабораторные исследования:** Рекомендуется сдать общий анализ крови, анализ мочи, а также провести бактериологическое исследование мочи для выявления инфекционного агента.
- Инструментальные исследования:** Возможно, потребуется ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей для оценки состояния стента и исключения обструкции.
- Антибиотикотерапия:** В зависимости от результатов анализов, может быть назначена

антибиотикотерапия. Самолечение антибиотиками не рекомендуется.

5. Общая поддержка здоровья: Поддерживайте адекватный питьевой режим, следите за температурой тела и общим самочувствием.

Важно следить за состоянием и при ухудшении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью.