

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Евгений

Возраст: 32

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.01.2025 08:14:46

формирования заключения врача: 23.01.2025 11:02:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318392/answer/318395>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **неприятные ощущения в области швов** спустя два месяца после обрезания. Также отмечает **ощущение рези** при соприкосновении с одеждой в области, где ранее находилась уздечка.

Анамнез заболевания

Пациент перенес обрезание два месяца назад. В послеоперационном периоде, вероятно, наблюдались стандартные процессы заживления, однако сохраняются неприятные ощущения в области швов и резь при контакте с одеждой.

Анамнез жизни

Значимых событий, не связанных с основной урологической проблемой, не указано.

Интерпретация предоставленных данных

После обрезания процесс заживления может занять несколько недель, и **неприятные ощущения в области швов** могут быть связаны с процессом рубцевания. Ощущение рези в области бывшей уздечки может указывать на повышенную чувствительность кожи или наличие рубцовой ткани, которая еще не полностью адаптировалась.

Заключение

Состояние пациента может быть связано с нормальным процессом заживления после обрезания, однако **сохраняющиеся неприятные ощущения** требуют дополнительного внимания для исключения возможных осложнений, таких как гипертрофические рубцы или инфекции.

Рекомендации

- Продолжайте соблюдать гигиену:** Убедитесь, что область швов содержится в чистоте и сухости.
- Избегайте тесной одежды:** Носите свободное белье, чтобы минимизировать контакт и трение в области швов.
- Обратитесь за очной консультацией:** Если неприятные ощущения сохраняются или усиливаются, рекомендуется обратиться к урологу для очной консультации для оценки

состояния рубцов и исключения осложнений.

4. Психологический комфорт: Поддерживайте открытое общение с партнером о своих ощущениях и возможных изменениях в сексуальной жизни после операции.