

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 37

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 04.02.2025 20:22:50

формирования заключения врача: 04.02.2025 21:27:36

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318536/answer/318538>



Заключение врача

Жалобы

Пациент жалуется на **болезненные волдыри и раздражение на коже пениса**, которые заживают, но снова появляются после полового акта с использованием презервативов и прикосновений. Симптомы включают боль и жжение.

Анамнез заболевания

Пациент отмечает периодическое появление болезненных высыпаний на коже пениса, которые заживают, но рецидивируют после половых контактов. Это состояние наблюдается на протяжении некоторого времени, и пациент связывает его с использованием презервативов и физическим контактом.

Анамнез жизни

Значительных событий в анамнезе жизни, не связанных с основным урологическим вопросом, не отмечено.

Интерпретация предоставленных данных

На основании предоставленного изображения и данных из атласа заболеваний мужских гениталий, вероятным диагнозом может быть **генитальный герпес (Herpes simplex virus - HSV)**. Генитальный герпес – это инфекция кожи гениталий, вызываемая вирусом простого герпеса, чаще всего типом 2 (HSV-2), но также возможен HSV-1. Вирус передается при тесном контакте с инфицированной кожей или слизистыми. Первичное инфицирование может протекать бессимптомно, но после инкубационного периода вирус остается в нервных ганглиях и может периодически реактивироваться, вызывая повторные эпизоды.

Заключение

Симптомы пациента, такие как **жжение, покалывание, зуд, появление болезненных везикул**, соответствуют клиническим проявлениям генитального герпеса. Возможны рецидивы, особенно после травматизации (например, при половом контакте). Также возможно увеличение паховых лимфатических узлов и жжение при мочеиспускании.

Рекомендации

1. **Очная консультация специалиста:** Лечение должно быть начато только после очной консультации уролога или дерматовенеролога для подтверждения диагноза и подбора адекватной терапии.

2. Обследование на генитальный герпес и другие ИППП:

- Пройти обследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для выявления вируса простого герпеса (HSV) и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

- Для этого необходимо сдать мазок из пораженной области или кровь для анализа.

3. Противовирусная терапия (после лабораторного подтверждения): Рассмотрите возможность назначения противовирусных препаратов, таких как Ацикловир, Валацикловир, или Фамцикловир, после консультации с врачом.

4. Обезболивающие средства: При сильной боли можно использовать обезболивающие препараты.

5. Местное лечение: Применение антисептических растворов для местного лечения пораженных участков.

6. Исключение половых контактов: На время лечения рекомендуется воздержаться от половых контактов.

7. Использование презервативов: После лечения для снижения риска передачи вируса.

8. Укрепление иммунитета: Ведение здорового образа жизни для укрепления иммунитета.

Обратите внимание на важность общения с партнером о проблемах и выслушивания его. Это может помочь в улучшении отношений и снижении стресса, связанного с заболеванием.