

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Пётр

Возраст: 62

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 15.02.2025 09:52:37

формирования заключения врача: 15.02.2025 13:05:06

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318594/answer/318596>



Заключение врача

1. Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на наличие **белого налёта вокруг уретерокутанеостомы**, который появился спустя 3 недели после операции. Налёт описывается как кристаллический.

2. Анамнез заболевания

Пациенту была выполнена **цистэктомия (удаление мочевого пузыря)** с формированием уретерокутанеостомы. Операция проведена 3 недели назад в другом городе. Послеоперационный период протекал без осложнений, но в настоящее время появился белый налёт вокруг стомы.

3. Анамнез жизни

Дополнительная информация о сопутствующих заболеваниях, аллергиях или других значимых факторах отсутствует.

4. Интерпретация предоставленных данных

Белый налёт вокруг уретерокутанеостомы, скорее всего, связан с **инфекцией мочевых путей**. Вот как это происходит:

- Инфекция мочевых путей (ИМП) часто вызывает **ощелачивание мочи**. Это означает, что pH мочи становится выше нормы (в норме моча слабокислая).
- В щелочной среде начинают выпадать в осадок **соли фосфатов**, такие как трипельфосфаты. Эти соли образуют кристаллы, которые могут откладываться на коже вокруг стомы, создавая белый налёт.
- Такое состояние может сопровождаться **неприятным запахом и раздражением кожи**.

5. Заключение

Наиболее вероятной причиной белого налёта является **инфекция мочевых путей**, которая приводит к ощелачиванию мочи и выпадению солей фосфатов. Это требует контроля и лечения.

6. Рекомендации

Для устранения налёта и предотвращения осложнений рекомендуется следующее:

1. Контроль инфекции и pH мочи:

- Используйте **тест-систему для экспресс-анализа мочи «Желтая бабочка»**. Её

можно приобрести на таких платформах, как Ozon, Яндекс.Маркет или Wildberries.

- Регулярно проверяйте pH мочи и наличие признаков инфекции (лейкоциты, нитриты).

2. Регулярный анализ мочи (ОАМ):

- Сдавайте общий анализ мочи для контроля состояния. На основании результатов врач сможет назначить антибактериальную терапию, если это необходимо.

3. Препарат Фосфалит:

- Обсудите с вашим лечащим урологом возможность назначения препарата **Фосфалит**. Он может уменьшать выделение солей фосфатов, что поможет предотвратить образование налёта.

4. Гигиена и уход за стомой:

- Регулярно промывайте область вокруг стомы тёплой водой с мягким мылом без отдушек.
- Промывать внутрь стомы нельзя!
- Используйте защитные кремы или пасты для предотвращения раздражения кожи.
- Регулярно требуется замена стомы

5. Питьевой режим:

- Увеличьте потребление жидкости (не менее 2 литров в день), чтобы снизить концентрацию мочи и уменьшить образование кристаллов.

6. Консультация специалиста:

- Если налёт сопровождается покраснением, отёком, болью или неприятным запахом, **немедленно обратитесь к урологу** для осмотра и коррекции лечения.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете контролировать состояние и предотвратить осложнения. Если симптомы сохраняются или ухудшаются, **не откладывайте визит к врачу**.