

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Али

Возраст: 51

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.03.2025 09:36:54

формирования заключения врача: 11.03.2025 10:46:27

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318789/answer/318790>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **отсутствие спермы (анэякуляцию)** после полового акта, что возникло через неделю после начала приема препарата **Канефрон**. При этом пациент отмечает, что ощущает оргазм, но сперма не выделяется.

Анамнез заболевания

Пациент перенес операцию по удалению камня из почки, после чего ему был назначен препарат **Канефрон** с целью профилактики рецидива мочекаменной болезни. Через неделю после начала приема препарата пациент заметил отсутствие спермы при эякуляции.

Анамнез жизни

Дополнительных данных о хронических заболеваниях, операциях или травмах, не связанных с текущей проблемой, не предоставлено. Уточняется, принимает ли пациент другие препараты, в частности **альфа-адреноблокаторы**, которые могут влиять на процесс эякуляции.

Интерпретация предоставленных данных

Отсутствие спермы при сохранении ощущения оргазма может быть связано с **ретроградной эякуляцией** — состоянием, при котором сперма попадает в мочевой пузырь вместо выхода через уретру. Это может быть вызвано приемом препаратов, влияющих на тонус сфинктера мочевого пузыря, или другими факторами. **Канефрон** редко вызывает такие побочные эффекты, но важно исключить другие возможные причины, включая прием альфа-адреноблокаторов.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить **ретроградную эякуляцию** как наиболее вероятную причину отсутствия спермы. Для уточнения диагноза необходимо провести дополнительные исследования.

Рекомендации

- Исключение ретроградной эякуляции:**
 - Сдать анализ мочи после полового акта для обнаружения сперматозоидов в моче.
- Уточнение принимаемых препаратов:**
 - Сообщить, принимает ли пациент **альфа-адреноблокаторы** (например, Тамсулозин, Доксазозин) или другие препараты, которые могут влиять на процесс

эякуляции.

3. Дополнительные обследования:

- Провести консультацию уролога для оценки состояния предстательной железы и мочевого пузыря.
- При необходимости выполнить ультразвуковое исследование органов малого таза.

4. Психологическая поддержка:

- Обсудить проблему с партнером, чтобы избежать недопонимания и стресса.
- При необходимости обратиться к психологу или сексологу для поддержки.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, рекомендуется обратиться за очной консультацией к урологу для более детального обследования и коррекции лечения.