

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Андрей

Возраст: 36

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.03.2025 08:58:19

формирования заключения врача: 19.03.2025 09:32:41

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318860/answer/318865>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на:

- **Отек левого яичка**, который появился три дня назад.
- **Повышение температуры тела** (точные цифры не указаны).

Анамнез заболевания

- **Три дня назад** пациент заметил отек левого яичка, который сопровождался повышением температуры тела.
- Другие симптомы (боль, покраснение, нарушение мочеиспускания, выделения из уретры) не указаны.
- Данные о ранее проведенных обследованиях или лечении отсутствуют.

Анамнез жизни

- Значимых событий, связанных с общим состоянием здоровья, не указано.
- Информация о перенесенных заболеваниях, травмах или операциях отсутствует.

Интерпретация предоставленных данных

Отек яичка в сочетании с повышением температуры тела может быть связан с несколькими состояниями:

1. **Орхит или эпидидимит** - воспаление яичка или его придатка, часто вызванное инфекцией (бактериальной или вирусной).
2. **Травма** - если имело место повреждение мошонки.
3. **Перекрут яичка** - острое состояние, требующее немедленного вмешательства.
4. **Гидроцеле** - скопление жидкости в оболочках яичка.
5. **Опухолевые процессы** - менее вероятно, но требует исключения.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить **острый воспалительный процесс в левом яичке или его придатке (орхит/эпидидимит)**. Однако для уточнения диагноза требуется дополнительное обследование.

Рекомендации

1. Немедленно обратиться к урологу для очного осмотра и проведения дополнительных исследований:

- УЗИ мошонки для оценки состояния яичка и придатка.
- Общий анализ крови и мочи для выявления признаков воспаления.
- При подозрении на инфекцию – мазок из уретры и анализ на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).

2. До визита к врачу:

- Исключить физические нагрузки.
- Использовать поддерживающее белье для уменьшения дискомфорта.
- При сильной боли можно принять **ибупрофен** или **парацетамол** для облегчения симптомов.

3. Не откладывайте визит к врачу, так как некоторые состояния (например, перекрут яичка) требуют экстренного лечения.