

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Сергей

Возраст: 28

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 21.03.2025 08:35:23

формирования заключения врача: 21.03.2025 08:42:12

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/318902/answer/318903>



Заключение врача

Жалобы

Пациент предъявляет жалобы на **выделения из полового члена желтоватого оттенка и жжение при мочеиспускании**.

Анамнез заболевания

Пациент ранее обращался за телемедицинской консультацией с аналогичными жалобами. Ситуация не изменилась: сохраняются выделения из полового члена и жжение при мочеиспускании.

Анамнез жизни

Данные о других заболеваниях, операциях, аллергиях или хронических состояниях отсутствуют. Уточните, пожалуйста, были ли ранее подобные выделения или инфекции мочеполовой системы.

Интерпретация предоставленных данных

Желтоватые выделения из полового члена и жжение при мочеиспускании могут указывать на наличие **инфекционного процесса** в мочеполовой системе. Возможные причины:

1. **Уретрит** – воспаление мочеиспускательного канала, вызванное инфекцией (бактериальной, вирусной или грибковой).
2. **Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)** – например, гонорея или хламидиоз, которые часто сопровождаются выделениями и жжением.

Необходимо уточнить диагноз с помощью лабораторных исследований.

Заключение

На основании предоставленных данных можно предположить наличие **уретрита** или **инфекции мочеполовой системы**. Для уточнения диагноза необходимы дополнительные обследования.

Рекомендации

Для уточнения диагноза и назначения лечения рекомендуется:

1. **Обратиться к урологу** для очного осмотра и забора анализов.
2. **Сдать анализы:**

- Общий анализ мочи.
 - Мазок из уретры на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.
 - Анализы на ИППП (гонорея, хламидиоз, трихомониаз и др.) методом ПЦР
3. **Использовать тест-систему для экспресс-анализа мочи «Желтая бабочка»**, если требуется частый контроль состояния.
 4. **Избегать половых контактов** до выяснения причины выделений, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
 5. **Соблюдать гигиену** половых органов, использовать мягкие моющие средства без отдушек.
 6. **Не заниматься самолечением**, так как неправильный прием антибиотиков может усугубить ситуацию.

Если выделения сопровождаются болью, зудом, повышением температуры или другими симптомами, обратитесь к врачу как можно скорее.