Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

# Телемедицинская консультация врача-уролога

## Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 42

**Пол:** Мужской

## Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

## Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 01.05.2025 19:38:38

**формирования заключения врача:** 01.05.2025 20:30:37

## Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** https://03uro.ru/consultations/question/319144/answer/319145

# Заключение врача

## Жалобы

Пациент отмечает визуальное увеличение вен на половом члене без сопутствующих субъективных ощущений (боли, дискомфорта, зуда).

## Анамнез заболевания

Постепенное усиление видимости венозного рисунка на половом члене с течением времени. Отсутствие болевого синдрома или функциональных нарушений (эрекция, мочеиспускание в норме).

## Анамнез жизни

Возраст 43 года. Варикозная болезнь других локализаций не указана. Сопутствующие заболевания, травмы половых органов, операции в анамнезе не упомянуты.

## Интерпретация представленных данных

**Физиологический вариант:** Усиление венозного рисунка может быть связано с возрастными изменениями кожи и подкожной клетчатки (истончение кожи, снижение эластичности).

**Патологические варианты:**

1. **Варикозное расширение вен полового члена** (редкая патология, обычно сопровождается дискомфортом)
2. **Лимфостаз** (при сопутствующем отеке)

## Заключение

Наиболее вероятен **физиологический вариант** возрастных изменений. Для исключения патологии требуется уточнение данных.

## Рекомендации

1. **Самообследование:**
    - Оценить симметричность венозного рисунка
    - Проверить наличие уплотнений по ходу вен
    - Отметить изменения при эрекции
2. **Консультация уролога очно** при появлении:
    - Болевых ощущений
    - Уплотнений

    - Изменения формы полового члена
3. **Общие рекомендации:**
    - Избегать травматизации
    - Контроль артериального давления (при гипертензии может усиливаться венозный рисунок)
    - Ношение свободного белья

## Дополнительная информация

**Когда стоит беспокоиться:** если вены становятся узловатыми, появляется болезненность или изменение формы полового члена при эрекции.

**Для наблюдения:** рекомендуется делать сравнительные фото с интервалом 3-6 месяцев при одинаковом освещении и степени эрекции (при наличии изменений).