Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 34

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.05.2025 14:26:32

формирования заключения врача: 22.05.2025 14:39:13

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/319250/answer/319253

Москва, 2025

Заключение врача

Жалобы

Пациент не предъявляет активных жалоб. Отсутствуют симптомы в виде выделений, боли или неприятного запаха. Обращение связано с подозрением партнерши на передачу молочницы (бактериального вагиноза).

Анамнез заболевания

Согласно предоставленной информации, у пациента отсутствуют клинические проявления урогенитальных инфекций. Партнерша предположила наличие молочницы (бактериального вагиноза), что стало поводом для обращения.

Анамнез жизни

Возраст 34 года, пол мужской. Данные о сопутствующих заболеваниях, перенесенных операциях, особенностях половой жизни и привычках не предоставлены.

Интерпретация представленных данных

Бактериальный вагиноз (молочница) не является инфекцией, передающейся половым путем. Это состояние связано с нарушением баланса микрофлоры влагалища у женщин. Однако половой контакт может выступать провоцирующим фактором для развития дисбиоза у партнерши.

Отсутствие симптомов у пациента не исключает полностью наличие урогенитальных инфекций, которые могут протекать бессимптомно.

Заключение

1. **Бактериальный вагиноз у партнерши** - наиболее вероятная причина жалоб, не связанная с ИППП.
2. **Бессимптомное носительство урогенитальных инфекций** - менее вероятно, но требует исключения при наличии сомнений.

Рекомендации

1. **Обследование методом ПЦР** на урогенитальные инфекции (хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, трихомонады, гонококк) для исключения ИППП
2. Партнерше рекомендуется консультация гинеколога для коррекции микрофлоры влагалища
3. При выявлении инфекции - лечение обоих партнеров

4. При отсутствии инфекции - соблюдение гигиены половой жизни:
    - Использование презервативов при смене партнера
    - Гигиена до и после полового акта
    - Избегание частой смены половых партнеров
    - Использование адаптивных лубрикантов, например, **цисталис гель интимный**

Дополнительная информация

Для обследования можно обратиться в любую клинику, где выполняют ПЦР-диагностику урогенитальных инфекций. Забор материала производится из уретры (у мужчин) и влагалища (у женщин).

Результаты анализов можно обсудить повторно для интерпретации и дальнейших рекомендаций.