

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Инна

**Возраст:** 55

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 15.04.2008 00:22:03

**формирования заключения врача:** 16.04.2008 13:28:30

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/32001/answer/32002>



## Заключение врача

Уважаемая Инна! Для ответа на Ваш вопрос необходимо знать точные результаты следующих обследований: УЗИ (почек, мочевого пузыря, забрюшинных лимфоузлов) или компьютерной томографии брюшной полости и забрюшинного пространства; общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, экскреторной урографии. Если эта почка не функционирует и является источником непрерывно-рецидивирующего воспалительного процесса, и если функция второй (левой почки) нормальная, то, возможно, правую почку целесообразно удалить. Но, как врач, Вы понимаете, что это очень серьезное решение, и оно принимается только после получения результатов всех обследований. С уважением.