Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Виктор

Возраст: 54

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.07.2025 10:46:20

формирования заключения врача: 11.07.2025 11:13:37

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/321719/answer/321720

Заключение врача

Жалобы

1. Пациент интересуется влиянием препарата **Тадалафил** на сердце.
2. Уточняющих жалоб, симптомов или сопутствующих заболеваний не указано.

Анамнез заболевания

1. Тадалафил был назначен врачом (не уточнено, по какому поводу — вероятно, для лечения эректильной дисфункции или симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы).
2. Данных о наличии сердечно-сосудистых заболеваний, принимаемых препаратах, эпизодах болей в сердце, одышки, повышенного давления и других симптомов нет.

Анамнез жизни

1. Возраст — 55 лет, мужчина.
2. Сведения о хронических заболеваниях, перенесённых операциях, образе жизни, вредных привычках и особенностях физической активности отсутствуют.

Интерпретация представленных данных

1. **Тадалафил** — это препарат из группы ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (ФДЭ-5), применяется для лечения эректильной дисфункции и симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
2. Влияние на сердце: Тадалафил может **расширять сосуды** и снижать артериальное давление, что обычно незначительно у здоровых людей, но может быть важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Основные риски связаны с одновременным приёмом нитратов (лекарств для лечения стенокардии) — это может вызвать резкое падение давления.
4. У пациентов с тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (неконтролируемая стенокардия, недавно перенесённый инфаркт, тяжёлая сердечная недостаточность) приём Тадалафила **не рекомендуется** без консультации кардиолога.
5. Если у Вас есть заболевания сердца, аритмии, перенесён инфаркт, инсульт, или Вы принимаете препараты для сердца — обязательно сообщите об этом врачу!

Заключение

1. В большинстве случаев **Тадалафил безопасен для сердца** у пациентов без выраженных сердечно-сосудистых заболеваний.
2. Основная опасность — сочетание с нитратами и тяжёлыми формами сердечных заболеваний.
3. Без дополнительной информации о Вашем состоянии нельзя дать окончательную оценку безопасности препарата именно для Вас.

Рекомендации

1. **Уточните у своего врача:** есть ли у Вас сердечно-сосудистые заболевания, какие препараты Вы принимаете (особенно нитраты, антигипертензивные средства, антиаритмические препараты).
2. При появлении таких симптомов, как боль в груди, одышка, выраженное головокружение, обмороки — **немедленно обратитесь к врачу**.
3. Если есть возможность — проконсультируйтесь с кардиологом или терапевтом по месту жительства.
4. Не превышайте рекомендованную дозу Тадалафила.
5. Если Вы не уверены в безопасности препарата для себя — **лучше пройти ЭКГ и базовое обследование сердца** (давление, пульс, анализы крови).

Дополнительная информация и инструкции

1. Если у Вас есть выписка, список принимаемых препаратов или результаты обследований — приложите их для более точной консультации.
2. Для качественной дистанционной консультации желательно сообщить:
    - Есть ли у Вас гипертония, ишемическая болезнь сердца, перенесённые инфаркты, инсульты, аритмии?
    - Какие препараты Вы принимаете постоянно?
    - Были ли у Вас эпизоды боли в сердце, одышки, отёков?
3. Если возникнут вопросы по приёму Тадалафила — не стесняйтесь уточнять!