Информационно-
консультативный портал
для урологических пациентов
03 uro 18+

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Фазилат

Возраст: 26

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 23.07.2025 18:27:21

формирования заключения врача: 24.07.2025 14:54:49

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: https://03uro.ru/consultations/question/322932/answer/323002

Заключение врача

Жалобы

1. Боли в области поясницы и/или живота после установки мочеточникового стента.
2. Появление крови в моче (гематурия).

Анамнез заболевания

1. 24 мая проведена операция по установке мочеточникового стента (Double-J).
2. Рекомендовано удаление стента через 1 месяц, однако по организационным причинам удаление не было выполнено вовремя.
3. На момент обращения прошло уже 2 месяца с момента установки стента.
4. Появились боли и кровь в моче.

Анамнез жизни

1. Возраст — 26 лет, женщина.
2. Информация о сопутствующих заболеваниях, перенесённых операциях, беременности, особенностях образа жизни и приёме лекарств не предоставлена.

Интерпретация представленных данных

Ситуация осложнена тем, что стент находится в мочеточнике дольше рекомендованного срока (2 месяца вместо 1). Это повышает риск осложнений:

- Инкрустация стента солями (отложение солей на поверхности стента), что может привести к его закупорке и нарушению оттока мочи.
- Развитие воспаления мочевых путей (цистит, уретрит, пиелонефрит).
- Появление крови в моче (гематурия) связано с раздражением слизистой мочевого пузыря и мочеточника, а также с возможной травматизацией или инфицированием.
- Боль может быть связана как с самим стентом (стент-ассоциированный синдром), так и с осложнениями (инфекция, обструкция, инкрустация).

Ваша ситуация требует срочного очного обращения к урологу!

Заключение

1. Высока вероятность осложнений, связанных с длительным пребыванием стента: инкрустация солями, воспаление, нарушение оттока мочи.
2. Появление крови и боли — тревожные признаки, которые могут указывать на развитие инфекции или закупорку стента.
3. Необходима срочная диагностика и удаление стента.

Рекомендации

1. **Срочно обратиться к урологу** (желательно к тому, кто устанавливал стент) для очного осмотра и решения вопроса об удалении стента.
2. Выполнить **обзорную урографию** — это рентгенологическое исследование, позволяющее оценить положение стента и наличие инкрустации солями.
3. Сдать **общий анализ мочи** — для выявления признаков воспаления, инфекции, крови.
4. Сдать **общий анализ крови** — для оценки общего состояния и признаков воспаления.
5. До визита к врачу — **контролировать температуру тела**, при появлении высокой температуры, озноба, сильной боли, резкого уменьшения объёма мочи — **немедленно вызвать скорую помощь**.
6. Не откладывать визит к врачу, так как длительное нахождение стента может привести к тяжёлым осложнениям.

Дополнительная информация и инструкции

- Симптомы после установки стента (боль, кровь в моче) — распространённое явление, но при длительном сроке нахождения стента риск осложнений существенно возрастает.
- После удаления стента врач может назначить дополнительные обследования и лечение в зависимости от выявленных осложнений.
- Для контроля состояния мочи в домашних условиях можно использовать **тест-систему «Жёлтая бабочка»** — это позволит быстро оценить наличие воспаления или крови в моче, но не заменяет лабораторный анализ.
- В дальнейшем строго соблюдайте сроки удаления или замены стентов, чтобы избежать подобных проблем.