

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Арам

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 17.09.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 17.09.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/324/answer/325>



Заключение врача

< Уважаемый Арам! Перелом полового члена - это не совсем точный термин, хотя он и употребляется в урологии. Более точное название этого вида травмы - подкожный разрыв кавернозных тел. Если повреждено одно кавернозное тело, то разрыв называют неполным; если оба - то полным. Лечение разрыва кавернозных тел только оперативное, проводится под общим обезболиванием. Разрез производится продольно или поперечно над местом повреждения, на сам разрыв накладывают частые кетгутовые швы, накладывают антисептическую повязку. Половой член шинируют, подвязывают кверху, к животу. Отграниченные, маленькие разрывы кавернозных тел без значительной гематомы у некоторых больных оставляют без хирургического вмешательства. Однако, если даже больной поправляется, некоторые нарушения половой функции (искривление полового члена, импотенция) все же имеют место, что в дальнейшем приводит к необходимости хирургической коррекции - удаление образовавшейся аневризмы, ушивание или пластика дефектов белочной оболочки и т.д. Поэтому, если врач рекомендует хирургическое вмешательство, то надо соглашаться во избежание возможных осложнений. Если будут ещё вопросы, пишите, буду рад помочь Вам.