

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Мария

**Возраст:** 37

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 17.05.2008 19:11:38

**формирования заключения врача:** 18.05.2008 15:23:48

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/33491/answer/33492>



## Заключение врача

Уважаемая Мария! Во время беременности почки претерпевают значительную нагрузку – не только потому, что работают на два организма, а потому, что вырабатываются гормоны, которые приводят к расширению мочеточника, а значит – более инфекция более легко проникает в почки из мочевого пузыря. Мочетоники могут передавливаться растущей маткой – вызывая расширение почечной лоханки и т. д. Причин для такой ситуации как у Вас достаточно. Катастрофы нет, но Вам необходима очная консультация уролога и дообследование (общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, биохимический анализ крови), УЗИ почек в динамике. Пока выполняйте позиционную гимнастику 3-4 раза в день по 15-20 минут – коленно-локтевое положение (т. е. на четвереньках) для того, чтобы матка отклонялась вперед, и не передавливала мочеточники. В таком положении можно читать, смотреть телевизор и т. д. Но не откладывайте дообследование. Удачи.