

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Митя

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 19.09.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 19.09.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/342/answer/343>



Заключение врача

Здравствуйтесь, Митя! Кондиломы вызываются вирусом, который относится к группе урогенитальных инфекций, т.е. инфекций, передающихся половым путем. Лечение Вам назначено верное. В этой ситуации надо лечить противовирусными препаратами, что Ваш врач и сделал. Но, кондиломы часто встречаются вместе с другими микробами, поэтому Вам и Вашей подруге надо ещё обследоваться на другую урогенитальную инфекцию (хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, гарднереллы, кандиды, трихомонады). Если у Вашей подруги эрозия шейки матки, то скорее всего она вызвана тоже урогенитальной инфекцией - по данным литературы чаще всего эрозию вызывают хламидии. Лечиться в случае обнаружения урогенитальной инфекции надо обоим. Действительно, этот вирус передается половым путем, и заразиться Вы или Ваша подруга могли от старых половых партнеров (несколько месяцев, лет назад), вирус находился в латентном (скрытом) состоянии, при малейшем ослаблении иммунной системы произошла манифестация заболевания. Заразиться можно только половым путем (поцелуи, вагинальный, анальный секс), через посуду и одежду заражение не происходит. Если пройти полный курс лечения обоим половым партнерам (во время лечения желательно воздержаться от половой жизни, т.к. даже применение презерватива не дает 100% гарантии от повторного заражения), сделать контрольные анализы, то при получении отрицательных результатов вероятность повторного проявления вируса крайне мала. У нас на сайте готовится к выпуску сборник по урогенитальной инфекции. Удачи Вам!