

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алекс

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 13.05.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 13.05.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/3486/answer/3487>



Заключение врача

Уважаемый Алекс! Уретероцеле – это расширение дистального отдела мочеточника (в месте впадения его в мочевой пузырь). Причинами развития уретероцеле могут быть обструкция (нарушение проходимости) устья мочеточника, неправильное мышечное строение этого отдела мочеточника, чрезмерная дилатация (расширение) дистального отдела мочеточника в ходе развития. Чаще всего уретероцеле выявляется при ультразвуковом исследовании. Уретероцеле бывает ортотопическое (если мочеточник один) и эктопическое (развивается при удвоении мочеточников). При ортотопическом уретероцеле применяют простое эндоскопическое рассечение уретероцеле. Чем оно опасно для здоровья: уретероцеле нарушает отток мочи, вызывает атонию и расширение всего мочеточника, уретерогидронефроз (расширение мочеточника и почечной лоханки) с резким снижением функции почки. Вид операции зависит от вида уретероцеле, его степени, от функциональной способности почки и еще от многих факторов. Пишите, если будут еще вопросы. [Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)