

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Александр

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.09.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 22.09.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/358/answer/359>



## Заключение врача

Здравствуйте, Александр! Подобные симптомы могут наблюдаться при урогенитальной инфекции, поэтому Вам необходимо обследоваться - сдать общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты и органов мошонки. Также надо сдать анализы на урогенитальную инфекцию (хламидии, микоплазмы, трихомонады, уреоплазмы, гарднереллы, и особенно на кандиды). Уточните ещё некоторые моменты - была ли у вас (перед тем как впервые появились подобные выделения) смена полового партнера, принимали ли вы перед этим какие-либо антибиотики по поводу других (неурологических) заболеваний, есть ли ещё жалобы - зуд, жжение, когда возникает боль в мочеиспускательном канале (перед, во время или после мочеиспускания). Местно можно рекомендовать промывать головку полового члена слабым раствором перманганата калия (марганцовка) 3-4 раза в день, после этого смазывать головку мазью АУРОБИН, эта мазь применяется для лечения несколько другого заболевания, но не обращайте внимания на аннотацию к ней. В ней содержится антибактериальное, противовоспалительное и анестезирующее (обезболивающее) средство. На время лечения необходимо воздерживаться от половой жизни. Конечно, некоторое ослабление эрекции может быть при таком виде инфекции, но не стоит впадать в депрессию по этому поводу, т.к. при правильно подобранном лечении эти симптомы обычно исчезают. При сообщении мне подробных сведений, буду рад помочь Вам. Но все-таки Вы должны понимать, что виртуальная помощь не может быть полноценной по сравнению с обычным урологическим осмотром.