

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Марьяна

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 22.05.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 22.05.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/3600/answer/3601>



Заключение врача

Уважаемая Марьяна! Анализы сдаются методом ПЦР-диагностики спустя 2 недели после предполагаемого заражения. Инфекции, которые имеют значение – хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, гарднереллы, трихомонады, кандиды, герпес I и II. Также необходимо сдать кровь на МОР, RW, ВИЧ. Контрольные анализы сдаются 3 месяца после окончания менструации (которая рассматривается как провокация). Первый раз обычно рекомендуется сделать гоновакцину 0,5-1 мл за сутки до предполагаемого обследования. Соскоб можно брать и из уретры, и из влагалища (так надежнее). Что касается средств экстренной профилактики, то лучше мирамистин – водный раствор хлоргексидина. Лучше будет, если санацию проведет специалист (при кожнодиспансерах должен быть кабинет экстренной профилактики именно для таких случаев). Пишите, если будут еще вопросы. [Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)