

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Марьяна

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.05.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 22.05.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/3600/answer/3601>



## Заключение врача

Уважаемая Марьяна! Анализы сдаются методом ПЦР-диагностики спустя 2 недели после предполагаемого заражения. Инфекции, которые имеют значение – хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, гарднереллы, трихомонады, кандиды, герпес I и II. Также необходимо сдать кровь на МОР, RW, ВИЧ. Контрольные анализы сдаются 3 месяца после окончания менструации (которая рассматривается как провокация). Первый раз обычно рекомендуется сделать гоновакцину 0,5-1 мл за сутки до предполагаемого обследования. Соскоб можно брать и из уретры, и из влагалища (так надежнее). Что касается средств экстренной профилактики, то лучше мирамистин – водный раствор хлоргексидина. Лучше будет, если санацию проведет специалист (при кожнодиспансерах должен быть кабинет экстренной профилактики именно для таких случаев). Пишите, если будут еще вопросы. [Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)