

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Пётр

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 22.05.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 22.05.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/3602/answer/3603>



## Заключение врача

Уважаемый Петр! Фимоз – это сужение крайней плоти, в результате которого невозможно обнажить головку полового члена. У детей фимоз бывает врожденным, потом он разрешается сам. По данным разных авторов головка полового члена должна открыться к 4-5 годам. В некоторых случаях, когда фимоз очень выражен, он может препятствовать нормальному мочеиспусканию. Во взрослом возрасте фимоз создает проблемы в половой жизни, кроме того, препуциальный мешок является местом скопления смегмы (выделения сальных желез, расположенных в этой области). При фимозе невозможно проведение в полном объеме гигиенических мероприятий, смегма полностью не удаляется, разлагается – поэтому появляется неприятный запах. Фимоз опасен не только постоянным наличием инфекции. Смегма обладает канцерогенным действием, т. е. может вызывать рак головки полового члена. Вам нужно обратиться к урологу по месту жительства – он назначит необходимые обследования и при необходимости – лечение. Вам, возможно, потребуется оперативное лечение – операция по иссечению крайней плоти (циркумцизио). Операция не относится к категории сложных, выполняется в любом урологическом отделении. Обычно никаких неблагоприятных последствий после этих операций не бывает. Пишите, если будут вопросы.

[Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)