

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** ирина

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 23.09.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 23.09.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/362/answer/363>



## Заключение врача

Уважаемая Ирина! Симптомы, описанные Вами, могут быть проявлением специфического или неспецифического воспаления. Чтобы выяснить это и определиться с диагнозом, надо обследоваться на урогенитальную инфекцию (хламидии, микоплазмы, трихомонады, уреаплазмы, гарднереллы, кандиды), сдать общий анализ мочи, сделать УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты. Но так как Вы с мужем уже начали курс антибиотикотерапии, то скорее всего все эти анализы будут неинформативными. Выход в подобной ситуации следующий - воздействовать на весь спектр урогенитальной флоры, т.е. принимать антибиотики широкого спектра действия. Сейчас Вы принимаете макропен - 7 дней, потом юнидокс солютаб (это доксициклина моногидрат) по 1 таб 3 раза в день - 7 дней и одновременно с ним метронидазол по 500 мг (2 таб) 3 раза в день - 7 дней, иммунал по 15 кап. 3 раза в день, линекс (т.к. возможно побочное развитие дисбактериоза). Весь курс рассчитан на 14 дней, лечиться должны оба. После окончания лечения, через 1 месяц необходимо сдать вышеперечисленные анализы для контроля. Во время лечения и до получения результатов контроля, желательно воздержаться от половой жизни (презерватив не дает 100% гарантии) во избежание реинфицирования. После окончания курса лечения сообщите о результатах. Если есть ещё вопросы, буду рад помочь коллегам.