

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** марина

**Возраст:** 41

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 20.02.2008 20:16:00

**формирования заключения врача:** 20.02.2008 20:32:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/36777/answer/36778>



## Заключение врача

Уважаемая Марина! Если У Вас прослеживается связь с половым контактом, то возможны два варианта. 1. Необходимо исключить заболевания, передающиеся половым путем (хламидии, трихомонады, микоплазмы, уреоплазмы, гарднереллы, кандиды). Если что-то обнаружится - пролечиться одновременно с половым партнером. 2. Если не будет ЗППП, то надо сдать посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам (на обычную флору). Тут связь с половым актом прослеживается таким образом - во время полового акта выделения из влагалища попадают на область наружного отверстия уретры, и потом восходящим путем в мочевой пузырь. Если Вам нужна консультация уролога в Москве - напишите мне на почту. Удачи!