

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Яна

**Возраст:** 43

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадеркина Виктория Анатольевна

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 26.02.2008 10:23:00

**формирования заключения врача:** 26.02.2008 17:48:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/36863/answer/36864>



## Заключение врача

Уважаемая Яна! Цистит, связанный с половым актом может иметь две причины - инфекция и низкое расположение уретры. 1. Вам необходимо исключить ЗППП (хламидии, трихомонады, кандиды, уреоплазмы, микоплазмы, гарднереллы), выполнить посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Если что-то выявится - провести курс лечения с обязательными контрольными анализами. 2. Необходим непосредственный осмотр уролога. Если у Вас низкое расположение уретры, то выделения из влагалища во время полового акта попадают на наружное отверстие уретры, и потом восходящим путем - в мочевой пузырь. Лечение в обоих случаях назначает уролог. Удачи!