

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Александр

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 28.05.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 28.05.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/3692/answer/3693>



Заключение врача

Уважаемый Александр! Трудно сказать без обследования, есть инфекция или нет, и что является причиной указанных ощущений. Инфекции, передающиеся половым путем, передаются только половым путем (разные виды половых контактов), полотенце не входит в эти контакты. Вряд ли симптомы появились бы на следующий день. Чтобы уточнить причину резей, сдайте общий анализ мочи, посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам, и анализы на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, микоплазмы, гарднереллы, кандиды и т. д.). Рези при мочеиспускании могут встречаться при многих урологических заболеваниях (циститах, простатитах, уретритах, мочекаменной болезни и т.д.). Все обследование и лечение лучше проходить под контролем уролога для своевременной коррекции. Удачи! [Шадёркин И.А.](#)