

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Василий

Возраст: 21

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 26.09.2003 12:00:00

формирования заключения врача: 26.09.2003 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/388/answer/389>



Заключение врача

Уважаемый Василий! При нормальной эрекции половой член должен увеличиваться и приобретать значительную плотность для введения его во влагалище, совершения фрикций. Положение полового члена при эрекции очень вариабельно и индивидуально. Важно не столько положение, сколько увеличение объема и твердость. К сожалению, Вы не указали ваш возраст, как давно отсутствует у Вас эрекция, это происходит со всеми половыми партнерами или с одним партнером, предшествовали ли этому какие-либо заболевания, в том числе и урологические, обращались ли вы к урологу, андрологу. Причины отсутствия эрекции весьма разнообразны, поэтому в первую очередь Вам надо обследоваться: сдать общий анализ мочи, анализы на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, уреаплазмы, микоплазмы, гарднереллы, кандиды), сделать УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты и органов мошонки. Начать обследование и лечение надо как можно быстрее, обратившись к урологу по месту жительства. Удачи!