

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Сергей

**Возраст:** 21

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.09.2003 12:00:00

**формирования заключения врача:** 30.09.2003 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/412/answer/413>



## Заключение врача

Здравствуйте, Сергей! Ваш врач совершенно прав, единственное, что перерывы в лечении делаются не только при неважных результатах, но и при положительных. Это делается для полного выведения препаратов из организма, для того, чтобы Вы отдохнули, т.к. невозможно беспрерывно лечиться. После окончания курса лечения целесообразно сделать перерыв на 2-3 месяца, и если за это время не было обострений, то это рассматривается как положительный результат. Цистоскопия - это инвазивный метод, травматичный, сопряжен с введением инородного тела в мочевой пузырь, поэтому его надо делать только при строгих показаниях, т.е. при обострении основного заболевания. Решение о проведении цистоскопии принимает только лечащий врач. По поводу иммунных препаратов - их применение показано при длительном, упорном течении хронических заболеваний, при ослаблении защитных сил организма, для их стимуляции. Поливитамины можно применять для общеукрепляющего действия - лучше брать витамины известных производителей (АЛВИТИЛ), там наиболее сбалансированный состав. Природные средства - элеутерококк, женьшень. Есть ещё поливитаминные лекарственные сборы (из трав), тоже дают очень хороший эффект. Пишите, буду рад помочь.