

## Телемедицинская консультация врача-уролога

### Пациент:

**Имя:** Катя

**Возраст:** 20

**Пол:** Женский

### Врач:

**ФИО:** Шадёркин Игорь Аркадьевич

**Специализация:** Уролог

**Учёная степень:** кандидат медицинских наук

### Дата и время:

**обращения пациента за консультацией:** 30.06.2004 12:00:00

**формирования заключения врача:** 30.06.2004 12:00:00

### Ссылка на электронную версию:

**Адрес в сети Интернет:** <https://03uro.ru/consultations/question/4140/answer/4141>



## Заключение врача

Уважаемая Катя! Поликистоз почек может давать повышение артериального давления, т. к. при этом заболевании происходит замещение почечной паренхимы (ткани почки) кистозными образованиями. Кисты могут быть разных размеров - от множества маленьких до огромных. Они могут нарушать отток мочи, поэтому и возникает повышение артериального давления. Если киста достигнет больших размеров (5 см и более), то ее можно и нужно пунктировать под контролем УЗИ. Никаких консервативных препаратов, замедляющих рост кисты нет. Частое и обильное мочеиспускание может быть не только из-за кист. Его причину трудно выяснить виртуально, надо внимательно изучить все анализы и результаты дополнительных обследований, уровень сахара в крови, функциональное состояние мочевого пузыря. Я рекомендую Вам регулярно наблюдаться у уролога, нефролога, терапевта. Надо постоянно контролировать общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ (почек, мочевого пузыря), уровень шлаков крови (креатинин, мочевины, остаточный азот), артериальное давление. Удачи!  
[Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)