

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Павел

Возраст: 40

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 20.10.2008 21:08:00

формирования заключения врача: 21.10.2008 07:28:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/45110/answer/45111>



Заключение врача

Уважаемый Павел! Варикоцеле - варикозное расширение вен гроздьевидного сплетения, развивающееся преимущественно с левой стороны. Как правило, наблюдается у детей старше 10-летнего возраста, а наибольшая частота варикоцеле приходится на 14-15 возраст.

Варикоцеле - результат обратного тока крови, направленного по яичковой вене из почечной в гроздьевидное сплетение. Это происходит в результате врожденного отсутствия клапанов в яичковой вене, или при развитии гипертензии в венозной системе почки при стенозе (сужении) почечной вены. Тяжесть состояния определяет не выраженность варикозного расширения вен семенного канатика, а наступающие нарушения сперматогенеза (рост и созревание сперматозоидов). Среди различных причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится 39%. С течением времени (без лечения) происходит изменение консистенции и размеров яичка вплоть до его атрофии. Консервативных методов лечения варикоцеле не существует, это заболевание лечится исключительно оперативным способом.

На размер полового члена варикоцеле не влияет.

Вам надо обратиться к урологу для осмотра, выполнения спермограммы, УЗИ органов мошонки и определения дальнейшей тактики. Удачи.