

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Алексей

Возраст: 37

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 27.10.2008 12:58:14

формирования заключения врача: 28.10.2008 07:48:59

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/45699/answer/45700>



Заключение врача

Уважаемый Алексей! Прежде всего, Вам надо исключить (или подтвердить) инфекцию мочеполовых путей, при которой чаще всего наблюдаются такие симптомы, выяснить вид инфекции. От этого зависит дальнейшая тактика. Поэтому Вам надо сдать анализы на урогенитальную инфекцию (хламидии, трихомонады, гарднереллы, микоплазмы, кандиды, уреаплазмы); общий анализ мочи; посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. Открывание головки полового члена также может быть затруднено в результате воспаления - баланопостита. Чтобы сказать точнее - нужен осмотр. После этого можно будет решить - есть патология или нет, назначить лечение (если необходимо). Удачи!