

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Владимир

Возраст: 69

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 05.11.2008 14:08:59

формирования заключения врача: 06.11.2008 20:24:22

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/46325/answer/46330>



Заключение врача

Уважаемый Владимир! 1. В раннем послеоперационном периоде после наложения эпицистостомы возможно подтекание мочи мимо дренажа (мочевого свища). Как правило, через несколько месяцев сформируется надлобковый свищ, который не даст мочи бежать мимо дренажа. 2. По современным требованиям мочевые дренажи не промываются. При промывании мочевого пузыря велика опасность возникновения катетерассоциированной мочевой инфекции. Если дренаж не работает, то его надо менять, а не промывать. В современных условиях устанавливают, в качестве надлобкового дренажа, катетер Фолея (с раздувным балончиком), а не катетер Петцера. При этом, после обучения, Катетер Фолея может менять как сам пациент, так и его родственники. 3. Лучше не промывать катетер (см. пункт 2). 4. Как правило, нормальный свищ формирует без необходимости проведения дополнительной хирургической коррекции. В очень редких случаях требуется проводить повторное хирургическое вмешательство. 5. Пока не сформируется свищ, не пережимайте дренаж (катетер). 6. Есть. Все зависит от причины нарушения оттока мочи. Т.е. необходимо урологическое обследование. Удачи!