

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Nigora

Возраст: 52

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 08.11.2008 19:19:27

формирования заключения врача: 08.11.2008 20:43:51

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/46547/answer/46549>



Заключение врача

Уважаемая Nigora! Если у ребенка имеется пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) 3-4 степени с рецидивирующими пиелонефритами то, скорее всего, ребенка необходимо оперировать. Но надо смотреть снимки. Если есть у Вас возможность сделать цифровые фотографии снимков на просвете (можно на стекле окна, но что бы на снимки не было теней домов, деревьев) и прикрепить их в новом вопросе вложением. Есть несколько методов оперативного лечения. 1. Введение гелевых растворов в стенку мочевого пузыря в области зияющих устьев мочеточников. Это малоинвазивная процедура, быстро выполняется, не требует разреза тканей. Но не во всех случаях эта процедура выполнима. 2. Есть лапароскопическая коррекция пузырно-мочеточникового рефлюкса. Через проколы в передней стенке живота погружают рефлюксирующие мочеточники в стенку мочевого пузыря. Также не во всех случаях она выполнима. 3. Открытая операция - уретероцистонеоанастомоз. Имеет очень хорошие результаты, но относительно инвазивная. Удачи!