

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Анна

Возраст: 39

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 09.11.2008 19:38:04

формирования заключения врача: 09.11.2008 19:49:01

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/46555/answer/46556>



Заключение врача

Уважаемая Анна. Если у Вас имеется нестабильный pH (кислотность) мочи, то можно заподозрить неэффективность цитратной терапии (например, блемареном). Для того, что бы цитратная терапия работала, необходимы 2 условия: 1) уратный нефролитиаз (т.е. камни должны быть уратными), 2) стабильно кислая моча (pH ниже 7) вне приема препарата. Прекратите прием препарат и через 2 дня проведите измерение pH мочи утром, днем и вечером. Если моча будет щелочная, то эффективность препарат блемарен будет незначительная. И стоит задуматься о другом способе лечения камней. Также Вам надо сделать несколько раз исследование мочи на состав солей. Без консультации и коррекции лечения грамотным урологом Вам не обойтись. Удачи!