

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Борис Борисович

Возраст: 87

Пол: Мужской

Врач:

ФИО: Шадеркина Виктория Анатольевна

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 07.11.2008 16:12:00

формирования заключения врача: 10.11.2008 07:24:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/46699/answer/46700>



Заключение врача

Уважаемый Борис Борисович! 1. Для уточнения причины учащенного мочеиспускания (инфекция, гиперактивный мочевой пузырь) надо выполнить общий анализ мочи, посев мочи на флору, уродинамическое обследование, УЗИ мочевого пузыря с определением количества остаточной мочи. Если будет выявлена инфекция - надо пройти курс противовоспалительной терапии, если будет выявлен гиперактивный мочевой пузырь - проводить и далее лечение везикаром, спазмексом, дриптаном, альфа-блокаторами - тем, что рекомендует из этих препаратов Ваш лечащий врач. 2. После ТУРа достаточно часто возникает ретроградная эякуляция - ситуация, когда сперма при оргазме забрасывается в мочевой пузырь. Это действительно никакой для Вас опасности не представляет, просто психологический дискомфорт. 3. Утренняя эрекция - это нормально. Удачи.