

Телемедицинская консультация врача-уролога

Пациент:

Имя: Екатерина

Возраст: 20

Пол: Женский

Врач:

ФИО: Шадёркин Игорь Аркадьевич

Специализация: Уролог

Учёная степень: кандидат медицинских наук

Дата и время:

обращения пациента за консультацией: 11.08.2004 12:00:00

формирования заключения врача: 11.08.2004 12:00:00

Ссылка на электронную версию:

Адрес в сети Интернет: <https://03uro.ru/consultations/question/4686/answer/4687>



Заключение врача

Уважаемая Екатерина! Лучше всего пересдать спермограмму, т. к. маловероятно, что клетки сперматогенеза могут появиться в эякуляте после полного их отсутствия. Дело в том, что если в спермограмме полностью отсутствуют сперматозоиды, то это характерно для экскреторной формы бесплодия (например, при двусторонней обструкции семявыносящих протоков). Если же в эякуляте нет сперматозоидов, но есть клетки сперматогенеза, то это состояние называется азооспермией, которая характерна для секреторной формы бесплодия (т. е. связанной с гормональными изменениями). Также малое количество спермы указывает на андрогенную недостаточность, либо также может указывать на непроходимость семявыносящих протоков. Как Вы видите, Катя, диагностика очень трудна. Вашему мужу требуется тщательное обследование в центре планирования семьи (такие центры есть сейчас во многих крупных городах). Пишите, если будут еще вопросы. [Шадёркин Игорь Аркадьевич](#)